



DOLUTÉGRAVIR (TIVICAY^{MC})

Comprimé de 50 mg

Comment ce médicament agit-il ?

Le dolutégravir (Tivicay) est un antirétroviral qui agit en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le dolutégravir fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de l'intégrase. Cette enzyme est nécessaire pour intégrer l'ADN du virus dans les lymphocytes T CD4+ (cellules du système immunitaire). Le Tivicay est prescrit en association avec d'autres antirétroviraux pour empêcher le virus d'attaquer le système immunitaire.

Le Tivicay ne guérit pas le SIDA et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.)

Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

Comment prendre ce médicament ?

Tivicay^{MC}

- 1 comprimé de 50 mg **1 fois** par jour
- 1 comprimé de 50 mg **2 fois** par jour

Le Tivicay peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de doses, suivre les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement. Il est important de prendre ces médicaments de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible.

L'adhésion au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation.

N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

Ne jamais arrêter ou modifier votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

Est-ce que je peux prendre le Tivicay^{MC} avec mes autres médicaments ?

Dofétilide (Tikosyn) : le Tivicay ne devrait pas être prescrit avec le dofétilide en raison du risque d'effets indésirables sérieux.

Oxcarbamazépine (Trileptal), phénytoïne (Dilantin), phénobarbital (Phénobarb), carbamazépine (Tegretol), névirapine (Viramune) millepertuis (St. John's wort), étravirine (Intelence) et metformine (Glucophage) sont des médicaments qui interagissent avec le Tivicay, vous devez en discuter avec votre médecin avant de les prendre. Des ajustements de doses ou un suivi pourront être suggérés si nécessaire.

Médicaments avec cations polyvalents ex. : antiacides, laxatifs, sucralfate peuvent diminuer l'absorption du Tivicay.

Tivicay doit être pris 2 heures avant ou 6 heures après ces médicaments.

Calcium et fer

Tivicay avec nourriture : Tivicay peut-être pris avec le fer ou le calcium sans espacement de dose.

Tivicay à jeun : Tivicay doit être pris 2 heures avant ou 6 heures après la prise de calcium ou de fer.

Consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre de nouveau médicament avec ou sans ordonnance.



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité
Continuez le médicament

- Difficulté à s'endormir
- Fatigue
- Diarrhée, nausées
- Maux de tête



Contactez votre médecin
Continuez le médicament

- Rash (rougeurs sur la peau) seul
- Douleur ou fatigue musculaire

Voyez **IMMÉDIATEMENT** votre médecin.

Rash **AVEC** :

- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche
- Enflure, cloques (bulles sur la peau)
- Rougeur des yeux
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Douleur ou faiblesse musculaire
- Grande fatigue



Suivi médical : par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de ces médicaments sur votre foie particulièrement si vous êtes porteurs de l'hépatite B ou C. En début de traitement, le médecin regardera également l'effet du Tivicay sur la clairance de la créatinine. Le Tivicay peut changer les paramètres de l'élimination de la créatinine sans toutefois affecter votre rein.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

J'ai oublié de prendre une dose !

AVEC LE TIVICAY 50 MG PRIS 1 FOIS PAR JOUR

Rappel de la dose oubliée le jour de la dose prévue : prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Rappel de la dose oubliée le lendemain de la dose prévue : laissez tomber la dose oubliée. Prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le Tivicay^{MC} ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.



Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

AVEC LE TIVICAY 50 MG PRIS 2 FOIS PAR JOUR

Si plus de 6 heures avant la prochaine dose : prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Si moins de 6 heures avant la prochaine dose : laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.




Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du Tivicay chez la femme enceinte.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le dolutégravir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Mode de conservation

Conservez le Tivicay dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F) ; évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez hors de la portée des enfants dans un contenant qui ferme bien, hors de la vue et de la portée des enfants.

