

Infection au VIH
Guide Thérapeutique
www.jag.on.ca/hiv

MÉTRONIDAZOLE (FLAGYL^{MD})

Comprimé à 250 mg, capsule à 500 mg



Comment ce médicament agit-il ?



Le métronidazole est un antibiotique utilisé pour le traitement de plusieurs types d'infections.

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie


Métronidazole

- ____ comprimé(s) à 250 mg
____ capsule(s) à 500 mg
- ____ fois par jour

Le métronidazole peut être pris avec ou sans nourriture.

Il est important de prendre le métronidazole de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



On peut éprouver avec le métronidazole une sécheresse de la bouche ou une modification du goût. En présence d'un mauvais goût, d'un goût amer ou métallique, prenez des bonbons durs non sucrés ou de la gomme à mâcher sans sucre.

Le métronidazole peut occasionner des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, de la diarrhée et des douleurs ou des crampes à l'estomac. La prise de métronidazole avec de la nourriture aidera à prévenir ces effets indésirables. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

D'autres effets tels que de la somnolence, des étourdissements, des maux de tête, une sensation de tête légère pourraient survenir. *Assurez-vous des effets que le métronidazole aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*

Enfin, l'urine peut devenir foncée avec le métronidazole. Cet effet est temporaire et disparaîtra lorsque le métronidazole sera cessé.



Est-ce que je peux prendre le métronidazole avec mes autres médicaments ?

- **Contraceptifs oraux (pilule contraceptive)**
L'efficacité de ce moyen de contraception peut être diminuée pendant le traitement au métronidazole. Il est recommandé de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que le condom en latex.

Le métronidazole peut interagir avec plusieurs autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le métronidazole ?

Il faut éviter les boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) durant le traitement et jusqu'à 24 à 48 heures après l'arrêt du traitement avec le métronidazole. La prise d'alcool avec le métronidazole pourrait amener des effets indésirables tels que de la douleur à l'estomac, des nausées ou des vomissements, des maux de tête, des rougeurs au visage, etc.

Grossesse et allaitement



On ne connaît pas bien les effets du métronidazole sur le déroulement de la grossesse. Le fabricant considère que le métronidazole est contre-indiqué pendant les trois premiers mois de la grossesse.

Suivez l'avis de votre médecin.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation


Conservez le métronidazole dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____