



Infection au VIH  
Guide Thérapeutique  
www.jag.on.ca/hiv

# ISETHIONATE DE PENTAMIDINE (PENTACARINAT<sup>MD</sup>)

Pour inhalation



## Comment ce médicament agit-il ?



La pentamidine en inhalation est utilisée pour la prévention de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (aussi appelée PPC).

## Comment prendre ce médicament ?

La pentamidine en inhalation est généralement administrée aux 4 semaines avec un appareil appelé le *Respirgard II*.

Votre posologie

Pentamidine	
_____ mg	
aux _____ semaine(s)	

Lors de l'administration du médicament, couchez-vous sur le dos ou allongez-vous sur le côté puis sur l'autre (à mi-traitement) plutôt que de rester assis. La pentamidine sera ainsi mieux distribuée partout dans vos poumons.

*N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.*

## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



La pentamidine en inhalation est généralement bien tolérée.

Certaines personnes peuvent présenter de la toux ou des bronchospasmes (difficulté respiratoire). La toux est plus fréquente chez les asthmatiques et les fumeurs. Généralement, le médecin vous prescrira un bronchodilatateur (médicament qui dilate les bronches) comme le salbutamol (Ventolin<sup>MD</sup>) que vous prendrez 5 à 10 minutes avant la pentamidine. Ceci vous aidera à mieux tolérer le traitement.

Parfois une irritation ou sensation de brûlure à l'arrière-gorge peut survenir. Afin de diminuer ce problème buvez de l'eau ou du jus.

Certaines personnes ressentent un goût amer après le traitement. Prenez des bonbons durs non sucrés, des glaçons ou de la gomme à mâcher sans sucre.

La pentamidine peut occasionnellement causer de l'hyperglycémie ou de l'hypoglycémie.

**L'hyperglycémie** est une augmentation anormale du taux de sucre dans votre sang. Elle peut se manifester par une soif intense, un besoin fréquent d'uriner, une grande fatigue, une somnolence, une perte de poids, une vision embrouillée, de la faim, des nausées, des vomissements. **Avisez rapidement votre médecin** si vous ressentez ces symptômes.

**L'hypoglycémie** est une diminution anormale du taux de sucre dans votre sang. Elle peut se manifester par une faim intense, des maux de tête, des sueurs, de l'irritabilité, de l'agressivité, de la faiblesse, des tremblements, des étourdissements. *Mangez un aliment sucré ou buvez un jus de fruit et **avisez rapidement votre médecin** si vous ressentez ces symptômes.*

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Afin que la prévention contre la pneumonie à *Pneumocystis carinii* soit efficace, vous devez recevoir la pentamidine toutes les 4 semaines.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_