

ÉTRAVIRINE (Intelence^{MD})

Comprimé : 200 mg

T200

Comment ce médicament agit-il ?

L'Étravirine est un antirétroviral qui agit en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Il agit en inhibant une enzyme appelée la transcriptase inverse. Le virus a besoin de cette enzyme pour se multiplier dans l'organisme.

L'Étravirine est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux afin de retarder la progression de la maladie et de réduire le risque d'apparition de diverses infections opportunistes (infections liées au sida).

L'Étravirine ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Comment prendre ce médicament ?

Étravirine

1 comprimés à 200 mg

2 fois par jour

L'Étravirine doit être pris **avec de la nourriture**. Les comprimés doivent être avaler en entier. Ne pas croquer ou écraser le comprimé. Toutefois, les comprimés peuvent être dissous dans l'eau. Bien mélanger, boire, rincer le verre et boire à nouveau.

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de dose, d'observer les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement.

Il est important de prendre l'Étravirine de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'observance au traitement permettra de prévenir l'apparition de **résistance** (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de

l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 6 heures après l'heure prévue : Prenez la dose oubliée dès que possible **avec de la nourriture** et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévue.

Si plus de 6 heures après l'heure prévue : Laisser tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose **avec de la nourriture** selon l'horaire prévue.



Ne doublez pas la dose.

Est-ce que je peux prendre l'Étravirine avec mes autres médicaments ?

L'Étravirine peut interagir avec certains médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréative.



Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités. **Continuez le médicament**



- Maux de tête, fatigue, difficulté à s'endormir
- Diarrhée, douleurs abdominales, nausées, brûlures d'estomac

Contactez votre médecin.
Continuez le médicament

Rash (rougeurs sur la peau) seul

Voyez **immédiatement** votre médecin



Rash AVEC :

- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche
- Enflure, cloques (bulles sur la peau)
- Rougeur des yeux
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Douleur aux muscles et articulations
- Grande fatigue
- Difficulté à respirer

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec l'Étravirine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments ou qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie).



Cependant, évitez de «sauter» une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée.

À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.


Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de l'Étravirine chez la femme enceinte.



Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre de l'Étravirine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de l'Étravirine dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F); évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.