

Abacavir (ZIAGEN®)

Tablette : 300 mg
Solution orale : 20 mg/mL



Comment ce médicament agit-il ?

L'abacavir est un antirétroviral qui agit en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Il agit en inhibant une enzyme appelée la transcriptase inverse. Le virus a besoin de cette enzyme pour se multiplier dans l'organisme.

L'abacavir est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux afin de retarder la progression de la maladie et de réduire le risque d'apparition de diverses infections opportunistes (infections reliées au sida).

L'abacavir ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

Comment prendre ce médicament ?

Abacavir

___ comprimé à 300 mg
ou ___ mL de la solution orale 20 mg/mL
___ fois par jour

L'abacavir peut être pris avec ou sans nourriture.

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de dose, d'observer les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement.

Il est important de prendre l'abacavir de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'observance au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4

(cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.


À moins d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

Est-ce que je peux prendre l'Abacavir avec mes autres médicaments ?

Il est peu probable que l'abacavir interagisse avec d'autres médicaments.

Néanmoins, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

On vous recommande de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre de nouveaux médicaments, même ceux qui ne nécessitent pas d'ordonnance (de prescription).



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Voyez **IMMÉDIATEMENT** votre médecin.
Le médecin peut devoir arrêter **définitivement** l'abacavir.

Rash (rougeur sur la peau) seul ou symptômes dans au moins 2 des groupes suivant :

- 1) fièvre
- 2) nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales
- 3) grande fatigue, malaise général
- 4) mal de gorge, essoufflement, toux
- 5) douleurs musculaires ou articulaires

Acidose lactique : douleur à l'estomac accompagnée de nausées et de vomissements, douleurs musculaires, faiblesse ou grande fatigue, rythme cardiaque rapide ou irrégulier

Ne jamais le reprendre par la suite, ni aucun autre médicament contenant l'abacavir (ex.: Trizivir^{MC}, Kivexa^{MD}).

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Si vous arrêtez par vous-même l'abacavir en raison d'effets indésirables ou d'une maladie, consultez votre médecin avant de le reprendre. Le médecin s'assurera qu'il ne s'agissait pas de symptômes évoquant une réaction d'hypersensibilité.

J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. **Ne doublez pas la dose.**

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec l'Abacavir ?



Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Conseils généraux


Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

Grossesse et allaitement



On ne connaît pas encore les effets de l'abacavir chez la femme enceinte.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre l'abacavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez les comprimés d'abacavir dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F); évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Conservez la solution orale d'abacavir à la température ambiante (15 à 25°C ou 59 à 77°F).

Gardez hors de la portée des enfants dans un contenant qui ferme bien.

