



Fosamprénavir (Telzir^{MD})

Comprimé : 700 mg



Ritonavir (Norvir^{MD})

Comprimé : 100 mg

Comment ces médicaments agissent-ils ?

Le fosamprénavir et le ritonavir sont des antirétroviraux qui agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le fosamprénavir et le ritonavir sont des médicaments qui font partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de la protéase virale. Ils inhibent avec puissance la maturation de nouvelles particules virales.

Le fosamprénavir est utilisé en association avec le ritonavir (Norvir^{MD}) et d'autres antirétroviraux afin de retarder la progression de la maladie et de réduire le risque d'apparition de diverses infections opportunistes (infections reliées au sida).

L'association fosamprénavir et ritonavir ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

Comment prendre ce médicament ?

Fosamprénavir

___ comprimé (s) à 700 mg ___ fois par jour

Ritonavir

___ comprimé (s) à 100 mg ___ fois par jour

L'association fosamprénavir et ritonavir peut être prise **avec ou sans nourriture**. Ne pas croquer ou écraser. Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de dose, d'observer les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement.

L'adhésion au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui

permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'adhésion au traitement. La clé du succès demeure la motivation.

N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

Est-ce que je peux prendre le fosamprénavir et le ritonavir avec mes autres médicaments ?

• Contraceptifs oraux (pilule contraceptive)

L'association fosamprénavir et ritonavir peut diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux. Il est recommandé de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que le condom en latex.

• Millepertuis (St. John's wort)


Le millepertuis peut diminuer l'efficacité du fosamprénavir et possiblement rendre le virus résistant à ce médicament. Ne prenez pas de millepertuis avec le fosamprénavir.

• Sildenafil (Viagra^{MD}), Tadalafil (Cialis^{MD}), Vardenafil (Levitra^{MD})

Le fosamprénavir et le ritonavir peuvent augmenter le risque d'effets indésirables de ces médicaments. Votre médecin diminuera la dose de Viagra^{MD}, Cialis^{MD}, ou Levitra^{MD}.

L'association fosamprénavir et ritonavir peut interagir avec plusieurs autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréative.



Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?

Effets normaux qui disparaîtront ou qui peuvent être traités.

Continuez le médicament



- Maux de tête
- Fatigue
- Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, diminution de l'appétit

Contactez votre médecin
Continuez le médicament



- Rash (rougeurs sur la peau) seul

Voyez **IMMÉDIATEMENT** votre médecin

Rash **AVEC** :

- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche
- Douleurs aux muscles et articulations
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Rougeur des yeux
- Enflure, cloques (bulles sur la peau)
- Grande fatigue, malaises généraux

Suivi médical : par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet du fosamprénavir/ritonavir sur votre foie et sur les gras (cholesterol, triglycérider) et sucre (glycémie).

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. **Ne doublez pas la dose.**



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le fosamprénavir et le ritonavir ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.



Cependant, évitez de «sauter» une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de fosamprénavir et de ritonavir dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F), évitez les endroits humides tels que la salle de bains.


Personne ressource : _____

Téléphone : _____

On ne connaît pas encore les effets du fosamprénavir et du ritonavir chez la femme enceinte.

Grossesse et allaitement

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre ces médicaments et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Si vous êtes allergiques aux sulfamidés; mentionnez-le à votre médecin avant de débiter le fosamprenavir.