

Abacavir / Lamivudine (Kivexa^{MC})

600 mg d'abacavir et 300 mg de lamivudine



Comment ce médicament agit-il ?

Le Kivexa^{MC} est l'association de 2 antirétroviraux : l'abacavir et la lamivudine. Ce sont des antirétroviraux qui agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Cette association fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Elle agit en inhibant une enzyme appelée la transcriptase inverse. Le virus a besoin de cette enzyme pour se multiplier dans l'organisme.

Le test HLAB*5701 devrait être fait avant de commencer une thérapie au moyen de l'Abacavir tel le Kivexa^{MC}. Le Kivexa^{MC} est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux afin de retarder la progression de la maladie et de réduire le risque d'apparition de diverses infections opportunistes (infections reliées au sida).

Le Kivexa^{MC} ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

Comment prendre ce médicament ?

Kivexa^{MC}

1 comprimé
600 mg d'abacavir et 300 mg de lamivudine

1 fois par jour

Le Kivexa^{MC} peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de dose, d'observer les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement.

Il est important de prendre le Kivexa^{MC} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'observance au traitement permettra de prévenir

l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement. À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin. Vous référer à la section : Quels sont les effets indésirables de ce médicaments ?

Si vous êtes porteur de l'hépatite B et cessez le Kivexa^{MC}, cela peut aggraver l'hépatite. La lamivudine qui est dans le Kivexa traite l'hépatite B.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.



Est-ce que je peux prendre le Kivexa^{MC} avec mes autres médicaments ?



Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréative.



Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?




Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités. **CONTINUEZ LE MÉDICAMENT**

- Fatigue
- Difficulté à s'endormir
- Troubles de digestion

Voyez **IMMÉDIATEMENT** votre médecin

Le médecin peut devoir arrêter **définitivement le kivexa^{MC}**.



Réaction d'hypersensibilité à l'abacavir :

Rash (rougeur sur la peau) seul ou avec des symptômes se retrouvant dans un moins 2 des groupes suivants :

- 1) Fièvre
- 2) Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales
- 3) Grande fatigue, malaise général
- 4) Mal de gorge, essoufflement, toux

N.B. La réaction d'hypersensibilité à l'abacavir se présente habituellement dans les 6 premières semaines du traitement.

Si vous avez un doute de faire une réaction d'hypersensibilité au Kivexa^{MC}, consultez votre médecin.

Si vous arrêtez par vous-même le Kivexa^{MC}, consultez votre médecin avant de le reprendre. Le médecin s'assurera qu'il ne s'agissait pas de symptômes évoquant une réaction d'hypersensibilité. À l'arrêt du Kivexa^{MC}, ne jamais le reprendre par la suite, ni aucun autre médicament contenant l'abacavir tel que Ziagen^{MC} et Trizivir^{MC}.

Acidose lactique :

nausées - vomissements - douleurs à l'estomac - perte de poids - grande fatigue et difficulté à respirer, rythme cardiaque irrégulier et sensation de froid (bras et jambes).

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le kivexa^{MC} ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments ou qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie).



Cependant, évitez de «sauter» une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée.

À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.


Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

On ne connaît pas encore les effets du Kivexa^{MC} chez la femme enceinte.

Grossesse et allaitement



Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le Kivexa^{MC} et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation



Conservez les comprimés de kivexa^{MC} dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F); évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien, hors de la vue et de la portée des enfants.