

Tipranavir (Aptivus^{MD})



Capsule : 250 mg

Ritonavir (Norvir^{MD})



Comprimé : 100 mg

Comment ces médicaments agissent-ils ?

Le tipranavir et le ritonavir sont des antirétroviraux qui agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le tipranavir et le ritonavir sont des médicaments qui font partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de la protéase virale. Ils inhibent avec puissance la maturation de nouvelles particules virales.

Le tipranavir en association avec le ritonavir et d'autres antirétroviraux sont utilisés afin de retarder la progression de la maladie et de réduire le risque d'apparition de diverses infections opportunistes (infections reliées au sida).

Le tipranavir et le ritonavir ne guérissent pas le sida et n'éliminent pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception efficace.

Comment prendre ces médicaments ?

Tipranavir	Ritonavir
2 capsules à 250 mg	1 comprimé à 100 mg
2 fois par jour	

Le tipranavir et le ritonavir doivent être pris en même temps, **avec de la nourriture**, à la même heure chaque jour, idéalement aux 12 heures. La prise de nourriture pourrait prévenir les effets gastro-intestinaux reliés à ces médicaments.

Les capsules de tipranavir et de ritonavir doivent être avalées en entier avec de l'eau, il ne faut pas les croquer, les mastiquer ou les écraser.

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de doses, d'observer les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement.

Il est important de prendre ces médicaments de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'observance au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à

reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

Ne jamais arrêter ou modifier votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

Est-ce que je peux prendre le Tipranavir et le Ritonavir avec mes autres médicaments ?


• **Sildenafil (Viagra^{MD}), tadalafil (Cialis^{MD}), vardenafil (Levitra^{MD})**
Augmentation du risque d'effets indésirables de ces médicaments et la dose de ces derniers doit être diminuée.

• **Les antiacides tels que : Maalox^{MD}, Gaviscon^{MD}, Diovol^{MD}**
diminuent l'absorption et l'efficacité du tipranavir. Évitez ces associations ou prenez le tipranavir 2 heures avant ou après les antiacides.

• **Millepertuis (Herbe de la St-Jean ou St-John's Wort)**
Le millepertuis peut diminuer l'efficacité du tipranavir. Ne prenez pas de millepertuis avec le tipranavir et le ritonavir.

• **Contraceptifs oraux (pilule contraceptive)**
Le tipranavir et le ritonavir peuvent diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux. Il est recommandé de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que le condom en latex. De plus les contraceptifs oraux avec oestrogènes peuvent augmenter le risque d'éruptions cutanées.

Le tipranavir et le ritonavir peuvent interagir avec plusieurs médicaments et substances à usage récréatif (ex. : Valium^{MD}, Démérol^{MD}, "Ecstasy", etc.).



On vous recommande de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre de nouveaux médicaments, même ceux qui ne nécessitent pas d'ordonnance (de prescription).



Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités
Continuez le médicament



- Diarrhée
- Nausées, flatulences (gaz), vomissements, douleurs abdominales
- Diminution de l'appétit
- Picotements autour de la bouche

Contactez votre médecin
Continuez le médicament



- **Rash** (rougeurs sur la peau) seul

Voyez
IMMÉDIATEMENT
votre médecin



Rash AVEC :

- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Enflure, cloques (bulles sur la peau)
- Douleur aux muscles et aux articulations
- Rougeur des yeux
- Grande fatigue, malaises généraux

Effets hépatiques (inflammation du foie)

- Selles pâles ou grasses, douleurs abdominales ou à l'estomac, perte d'appétit
- Urine foncée, jaunissement de la peau et du blanc des yeux
- Fatigue/faiblesse
- Démangeaisons intenses

Si vous êtes porteur de l'hépatite B ou C, vous courez un risque plus élevé de problèmes hépatiques.

Suivi médical

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de ces médicaments sur votre foie, sur les gras (cholestérol, triglycérides) et sur le sucre (glycémie).

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

J'ai oublié de prendre une dose !



Si moins de 5 heures après l'heure prévue :

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Si plus de 5 heures après l'heure prévue :

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le Tipranavir et le Ritonavir ?



Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous êtes allergiques aux sulfamides, mentionnez-le à votre médecin avant de débuter le tipranavir.


Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

On ne connaît pas encore les effets du tipranavir et du ritonavir chez la femme enceinte.

Grossesse et allaitement



Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le tipranavir et le ritonavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Les capsules de tipranavir doivent être conservées au réfrigérateur (2 à 8°C ou 36 à 46°F). Elles peuvent également être conservées à la température ambiante (moins que 25°C ou 77°F), pour une durée maximale de 60 jours. Les comprimés de ritonavir peuvent être conservés à la température de la pièce.



Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien, hors de la vue et de la portée des enfants.