

# Atazanavir (Reyataz)



Capsule à 200 mg

## Comment ce médicament agit-il ?

L'atazanavir est un antirétroviral qui agit en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). L'atazanavir est un médicament qui fait partie de la classe des inhibiteurs de la protéase virale. Il inhibe avec puissance la maturation de nouvelles particules virales.

L'atazanavir est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux afin de retarder la progression de la maladie et de réduire le risque d'apparition de diverses infections opportunistes (infections reliées au sida).

L'atazanavir ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

## Comment prendre ce médicament ?

### Atazanavir

2 capsules à 200 mg

1 fois par jour

L'atazanavir doit être pris avec de la nourriture (repas léger ou collation), à la même heure chaque jour, environ aux 24 heures.

Ne pas ouvrir les capsules, elles doivent être avalées en entier. Boire beaucoup d'eau durant la journée

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de dose, d'observer les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement.

Il est important de prendre l'atazanavir de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible.

L'observance du traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

*Ne jamais arrêter ou modifier votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.*

## Est-ce que je peux prendre l'atazanavir avec mes autres médicaments ?

### • Antiacides tels que Maalox<sup>MD</sup>, Diovol<sup>MD</sup> et Gaviscon<sup>MD</sup> ?

Prenez l'atazanavir 2 heures avant ou 1 heure après la prise des antiacides.

• **Médicaments utilisés pour diminuer l'acidité gastrique** tels que la cimétidine (Tagamet<sup>MD</sup>), le dexlansoprazole (Dexilant<sup>MD</sup>), l'esoméprazole (Nexium<sup>MD</sup>), la famotidine (Pepcid<sup>MD</sup>), l'oméprazole (Losec<sup>MD</sup>), le pantoprazole (Pantoloc<sup>MD</sup>), le lansoprazole (Prevacid<sup>MD</sup>), la nizatidine (Axid<sup>MD</sup>), la ranitidine (Zantac<sup>MD</sup>) et le rabeprazole (Pariet<sup>MD</sup>).

Ces médicaments peuvent diminuer l'absorption de l'atazanavir. Mentionnez à votre médecin ou pharmacien si vous prenez ces médicaments.

### • Sildenafil (Viagra<sup>MD</sup>), tadalafil (Cialis<sup>MD</sup>), vardenafil (Levitra<sup>MD</sup>)

L'atazanavir peut augmenter le risque d'effets indésirables due à ces médicaments et la dose de ces médicaments devra être diminuée.

### • Millepertuis (St. John's wort)

Le millepertuis peut diminuer l'efficacité de l'atazanavir et possiblement rendre le virus résistant à ce médicament. Ne prenez pas de millepertuis avec l'atazanavir.

### • Jus de pamplemousse

Éviter la consommation.

L'atazanavir peut interagir avec plusieurs médicaments et substances à usage récréatif (ex. : Demerol<sup>MD</sup>, Valium<sup>MD</sup>, "Ecstasy", etc.).

*Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre de nouveaux médicaments, même ceux qui ne nécessitent pas d'ordonnance (de prescription).*



## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités.  
**Continuez le médicament**

- Douleur au ventre
- Nausées, diarrhée
- Maux de tête



Contactez votre médecin  
**Continuez le médicament**

- Jaunissement de la peau ou du blanc de l'oeil
- Rash (rougeurs sur la peau) seul

Voyez **IMMÉDIATEMENT** votre médecin

### Rash AVEC :

- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche
- Enflure, cloques (bulles sur la peau)
- Rougeur des yeux
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Douleurs aux muscles et articulations



### Effet sur le rythme cardiaque :

- étourdissements, palpitations ou battements cardiaques irréguliers

Pierres aux reins : douleur dans le dos ou sur le côté, sang dans l'urine, douleurs lorsqu'on urine

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

## J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.



## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec l'atazanavir ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.




santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de

On ne connaît pas encore les effets de l'atazanavir chez la femme enceinte.

## Grossesse et allaitement

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre l'atazanavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

## Mode de conservation

Conservez les capsules d'atazanavir dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F) ; évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien, hors de la vue et de la portée des enfants.

