

GENVOYA

150 mg Elvitégravir + 150 mg Cobicistat + 10 mg Ténofovir
alafenamide + 200 mg emtricitabine



Comment ce médicament agit-il ?

Le Genvoya est l'association de 4 médicaments.

L'elvitégravir fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de l'intégrase. Cette enzyme est nécessaire pour intégrer l'ADN du virus dans les lymphocytes TCD4+ (cellules du système immunitaire). L'emtricitabine et le ténofovir alafenamide quant à eux font partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de la transcriptase inverse. Ils agissent en inhibant une enzyme appelée la transcriptase inverse. Le virus a besoin de cette enzyme pour se multiplier dans l'organisme. Le cobicistat est utilisé pour potentialiser l'effet de l'elvitégravir.

Le Genvoya ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Avec une charge virale détectable, vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact par le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.). Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

Comment prendre ce médicament ?

Genvoya

□ 1 comprimé **1 fois** par jour

Le Genvoya doit être pris **avec de la nourriture**. Le comprimé doit être avalé en entier, sans le croquer, le couper ou l'écraser.

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de doses, de suivre les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement.

Il est important de prendre Genvoya de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'adhésion au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

Si vous êtes porteur de l'hépatite B et cessez le Genvoya, cela peut aggraver l'hépatite.

Ne jamais arrêter ou modifier votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

Est-ce que je peux prendre Genvoya avec mes autres médicaments ?

Informez votre professionnel de la santé si vous prenez un médicament :

- Pour réduire le taux de cholestérol, comme le lovastatine ou le simvastatine
- Contre la goutte, comme la colchicine
- Pour le traitement de la tuberculose, comme la rifampicine
- Contre les crises convulsives, comme carbamazépine (Tégrétol), phénytoïne (Dilantin) et le phénobarbital
- Médicaments contre l'augmentation du volume de la prostate tel que l'alfuzosine (Xatral)
- Pour l'anxiété ou le sommeil comme le triazolam (Halcion), clonazépan (Rivotril)
- Contre l'hypertension pulmonaire comme le Sildénafil (Adcirca)
- Pour les poumons ou les sinus comme fluticasone (Advair, Flovent, Flonase) ou salmétérol (Serevent, Advair)
- Pour l'impuissance comme sildénafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra)
- Produit naturel : Millepertuis (St. John's Wort)

Le Genvoya est une association de plusieurs médicaments et il ne faut pas l'associer avec d'autres qui présentent les composantes semblables ou identiques. Le Genvoya ne doit pas être administré avec l'adéfovir (Hepsera), le ténofovir (Viread/Vemlidy/Truvada/Descovy/Atripla/Complera/Odefsey), la lamivudine (3TC, Heptovir, Kivexa, Triumeq, Combivir et Trizivir), raltégravir (Isentress, Isentress HD) et dolutégravir (Tivicay, Triumeq).

Les médicaments avec cations polyvalents (par exemple les antiacides comme le Maalox) peuvent diminuer l'absorption du Genvoya. Prenez le Genvoya 2 heures avant ou après la prise d'un antiacide avec cations polyvalents.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?

Le Genvoya est un antirétroviral qui est **généralement bien toléré**.



Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité
Continuez le médicament

- Diarrhées, nausées et perte d'appétit
- Maux de tête
- Difficulté à s'endormir

Contactez votre médecin
Continuez le médicament



- Rash (rougeurs sur la peau)
- Douleur au niveau des os
- Hyperpigmentation des paumes et de la plante des pieds
- Décoloration de la peau (petites taches ou taches de rousseur)
- Douleur ou fatigue musculaire

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera les effets du médicament dans votre système.

J'ai oublié de prendre une dose !



Si plus de 12 heures avant la prochaine dose :
Prenez la dose oubliée dès que possible avec de la nourriture et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Si moins de 12 heures avant la prochaine dose :
Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose avec de la nourriture selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du Genvoya chez la femme enceinte.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre du Genvoya et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Genvoya dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Genvoya ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre traitement.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.



Personne ressource : _____

Téléphone : _____