



# Lédipasvir | sofosbuvir

(HARVONI<sup>MC</sup>) Comprimé à 90/400 mg



## Comment ce médicament agit-il ?

HARVONI<sup>MC</sup> est une combinaison de deux médicaments, soient lédipasvir et sofosbuvir, indiqué pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

HARVONI<sup>MC</sup> bloque plusieurs étapes du processus de réplication du virus. Ceci empêche la multiplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

## ● Comment prendre ce médicament ?

HARVONI<sup>MC</sup> ➔ 1 comprimé à 90/400 mg  
Prenez 1 comprimé 1 fois par jour.

Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.

Il est important de prendre HARVONI<sup>MC</sup> de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

La durée de traitement peut varier de 8, 12 à 24 semaines dépendant :

- Du type de virus
- De la quantité de virus dans votre sang
- De votre condition hépatique
- De la réponse antérieure au traitement

## ● Est-ce que je peux prendre HARVONI<sup>MC</sup> avec mes autres médicaments ?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Informez particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez ce qui suit :

- Antiacides ou médicaments pour les brûlements d'estomac et le reflux, comme ranitidine (Zantac<sup>MC</sup>), famotidine (Pepcid<sup>MC</sup>), oméprazole (Losec<sup>MC</sup>, Olex<sup>MC</sup>), pantoprazole (Pantoloc<sup>MC</sup>), esoméprazole (Nexium<sup>MC</sup>), lansoprazole (Prevacid<sup>MC</sup>)
- Médicaments pour prévenir les crises convulsives, comme carbamazépine (Tégréto<sup>MC</sup>),

oxcarbazépine (Trileptal<sup>MC</sup>), phénytoïne (Dilantin<sup>MC</sup>), phénobarbital (Phenobarb<sup>MC</sup>)

- Médicament pour le traitement des infections telles que la tuberculose, comme rifampine, rifabutine (Mycobutin<sup>MC</sup>)
- Médicament pour abaisser le taux de cholestérol, comme rosuvastatine (Crestor<sup>MC</sup>)
- Médicament pour contrôler le rythme cardiaque, comme digoxine (Toloxin<sup>MC</sup>), amiodarone (Cordarone<sup>MC</sup>)
- Médicaments contre l'infection par le VIH : tipranavir-r (Agénérase<sup>MC</sup>/Norvir<sup>MC</sup>), ténofovir (Truvada<sup>MC</sup>, Viread<sup>MC</sup>, Complera<sup>MC</sup>, Stribild<sup>MC</sup>, Atripla<sup>MC</sup> et Genvoya<sup>MC</sup>)
- Produit naturel : Millepertuis (St John's wort)

## ● Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les effets indésirables principaux observés d'HARVONI<sup>MC</sup> sont d'intensité légère et ne nécessitent pas d'arrêt du traitement.


Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre si vous avez des vomissements :

- **Moins de 5 heures** après la prise d'HARVONI<sup>MC</sup>, il faut reprendre une autre dose.
- **Plus de 5 heures** après la prise d'HARVONI<sup>MC</sup>, il faut reprendre la dose suivante au moment prévu initialement.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.





À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

### ● Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec HARVONI<sup>MC</sup> ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie. De plus l'alcool pourrait diminuer l'efficacité du traitement.

### ● Grossesse

On ne connaît pas encore les effets du lédirasvir et du sofosbuvir chez la femme enceinte.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez débiter un traitement contre le virus de l'hépatite C et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

### Allaitement

La présence du lédirasvir, du sofosbuvir et de leurs métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement d'HARVONI<sup>MC</sup>.

### ● Mode de conservation

Conservez les comprimés d'HARVONI<sup>MC</sup> dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30 °C ou 59 à 86 °F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

### ● Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

### ● J'ai oublié de prendre une dose !



Si moins de 18 heures après l'heure prévue :  
Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Si plus de 18 heures après l'heure prévue :  
Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.



Ne doublez pas la dose.