

Maraviroc (Celsentri^{MD})

Comprimés : 150 et 300 mg



Comment ce médicament agit-il ?

Le VIH pénètre dans les lymphocytes T CD4+ du système immunitaire en se liant à un récepteur (CCR5 ou CXCR4) à la surface de ces cellules. Le maraviroc agit en bloquant le récepteur CCR5, de manière à ce que le virus du VIH ne puisse pas s'en servir pour entrer dans le lymphocyte. Le type de virus qui utilise ce récepteur est appelé virus à tropisme CCR5. Avant l'utilisation du maraviroc votre médecin doit faire un test pour vérifier si vous avez un virus à tropisme CCR5.

Le maraviroc est utilisé avec d'autres médicaments anti-VIH afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à maintenir un système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le maraviroc ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

Comment prendre ce médicament ?

Maraviroc

___ comprimés à ___ mg

2 fois par jour **avec ou sans nourriture**

autre

Les comprimés de maraviroc doivent être avalés en entier avec de l'eau. Il ne faut pas les croquer, les mastiquer ou les écraser.

Il est important de prendre le maraviroc de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible.

L'observance du traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui

se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance au traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

Ne jamais arrêter ou modifier votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 6 heures après l'heure prévue :
Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Si plus de 6 heures après l'heure prévue :
Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.




Ne doublez pas la dose.

Est-ce que je peux prendre le maraviroc avec mes autres médicaments ?

Le maraviroc peut interagir avec plusieurs médicaments et la dose devra être ajustée.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre ou un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités
Continuez le médicament

- Diarrhée, flatulences, nausées
- Maux de tête



Consultez votre médecin.
Continuez le médicament

- Toux
- Fatigue
- Symptômes ressemblant à ceux de la grippe
- Rash (rougeurs sur la peau)



Arrêtez de prendre le mavaviroc et contacter **IMMÉDIATEMENT** votre médecin.



Symptômes hépatiques :

- Selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, perte d'appétit/nausées
- Fatigue/faiblesse
- Urine foncée, jaunissement de la peau et du blanc des yeux
- Démangeaisons intenses

Si vous êtes porteur de l'hépatite B ou C, vous êtes davantage à risque d'hépatite (inflammation du foie).

Le maraviroc est un médicament habituellement bien toléré.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le maraviroc ?

La prise d'alcool avec les anti-VIH en général est à déconseiller car la consommation régulière d'alcool peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur d'une hépatite. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.



Cependant, évitez de «sauter» une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.


Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du maraviroc chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le maraviroc et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de maraviroc dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F) ; évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

