

# PREZCOBIX (DARUNAVIR | COBICISTAT)

Comprimé de 800 mg de Darunavir et 150 mg de Cobicistat



## Comment ce médicament agit-il ?

Le Prezcobix est l'association de 2 médicaments. Le darunavir et le cobicistat agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Le darunavir fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de la protéase virale. Ils inhibent avec puissance la maturation de nouvelles particules virales. Le cobicistat est utilisé pour potentialiser l'effet du darunavir. Le Prezcobix en association avec d'autres antirétroviraux est utilisé afin de retarder la progression de la maladie et de réduire le risque d'apparition de diverses infections opportunistes (infections liées au sida).

Le Prezcobix ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. En présence d'une charge virale détectable, vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact par le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.). Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

## Comment prendre ce médicament ?

### Prezcobix

1 comprimé **1 fois** par jour

Ce médicament doit être pris **avec de la nourriture**.

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de doses, de suivre les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement.

Il est important de prendre le Prezcobix de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'adhésion au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement.

La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

À moins d'effets indésirables sérieux, ne jamais arrêter ou modifier votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

## Est-ce que je peux prendre Prezcobix avec mes autres médicaments ?

Informez votre professionnel de la santé si vous prenez un médicament :

- Pour réduire le taux de cholestérol, comme le lovastatine ou le simvastatine
- Contre la goutte, comme la colchicine
- Pour le traitement de la tuberculose, comme la rifampicine
- Contre les crises convulsives, comme carbamazépine (Tégréol), phénytoïne (Dilantin) et le phénobarbital
- Médicaments contre l'augmentation du volume de la prostate tel que l'alfuzosine (Xatral)
- Pour l'anxiété ou le sommeil comme le triazolam (Halcion), clonazépam (Rivotril)
- Contre l'hypertension pulmonaire comme le Sildénafil (Adcirca)
- Pour les poumons ou les sinus comme fluticasone (Advair, Flovent, Flonase) ou salmétérol (Serevent, Advair)
- Pour l'impuissance comme sildénafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra)
- Produit naturel : Millepertuis (St. John's Wort).

Ces médicaments sont contre-indiqués ou doivent être évités avec le Prezcobix. Une solution de rechange ou des ajustements de doses avec un suivi plus étroit vous seront proposés.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



## Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?

Le Prezcobix est un antirétroviral qui est **généralement bien toléré**.



Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité  
**Continuez le médicament**



- Diarrhées
- Nausées et vomissements
- Douleurs à l'estomac
- Maux de tête

Contactez votre médecin  
**Continuez le médicament**

- Rash (rougeur sur la peau) seul



Voyez **IMMÉDIATEMENT** votre médecin

**Rash avec :**

- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche
- Enflure, cloque (bulles sur la peau)
- Rougeur et inflammation des yeux
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Douleurs musculaires et articulaires
- Grande fatigue

**Effets hépatiques (inflammation du foie) :**

- Selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, perte d'appétit
- Urine foncée, jaunissement de la peau et du blanc des yeux
- Fatigue/faiblesse
- Démangeaisons intenses

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer. Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera les effets du médicament dans votre système. Si vous êtes porteur du virus de l'hépatite B ou C, vous courez un risque plus élevé de problèmes hépatiques.

## J'ai oublié de prendre une dose !



**Si plus de 12 heures avant la prochaine dose :**

Prenez la dose oubliée dès que possible avec de la nourriture et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

**Si moins de 12 heures avant la prochaine dose :**

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose avec de la nourriture selon l'horaire prévu.

**Ne doublez pas la dose.**

## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le Prezcobix ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre traitement.

## Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du Prezcobix chez la femme enceinte.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre du Prezcobix et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Mode de conservation

Conservez les comprimés le Prezcobix dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien, hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_