



## Ribavirine

(Moderiba<sup>MC</sup>) Comprimé à 200, 400 ou 600 mg

(Ibavyr<sup>MC</sup>) Comprimé à 400 ou 600 mg

### Comment ce médicament agit-il ?

La ribavirine est un agent antiviral, indiquée en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

La ribavirine est un analogue nucléosidique qui agit à plusieurs niveaux sur le processus de réplication du virus.

Ceci empêche la réplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

### Comment prendre ce médicament ?

Ce médicament doit être pris avec de la nourriture, 2 fois par jour, au déjeuner et au souper.

Il peut vous être prescrit à des doses variables.

Ibavyr <sup>MC</sup>	Moderiba <sup>MC</sup>
<input type="checkbox"/> 1 comprimé (blanc) à 600 mg au déjeuner, 1 comprimé (rose) à 400 mg au souper	<input type="checkbox"/> 1 comprimé (bleu) à 400 mg au déjeuner, 1 comprimé (bleu foncé) à 600 mg au souper
<input type="checkbox"/> 1 comprimé (blanc) à 600 mg au déjeuner et au souper	<input type="checkbox"/> 1 comprimé (bleu foncé) à 600 mg au déjeuner et au souper

La **ribavirine** est toujours associée à d'autres médicaments agissant contre le VHC (Harvoni<sup>MC</sup>, Sovaldi<sup>MC</sup> ou Hologic Pak<sup>MC</sup>) et ne doit pas être utilisé seule.

Il est important de prendre la **ribavirine** et les autres médicaments associés de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

La durée de traitement peut varier de 12 à 24 semaines dépendant :

- Du type de virus
- De votre poids
- De votre condition hépatique
- De la réponse antérieure au traitement
- De votre taux d'hémoglobine
- De l'état de votre cœur

### Est-ce que je peux prendre la ribavirine avec mes autres médicaments ?

La **ribavirine** interagit peu avec les autres médicaments. Cependant, informez particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Videx<sup>MC</sup> (didanosine, ddl)
- Zerit<sup>MC</sup> (stavudine, d4T)
- Imuran<sup>MC</sup> ou Purinethol<sup>MC</sup> (azathioprine, mercaptopurine)


Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

### Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Ce médicament peut provoquer certains effets indésirables. Dans la plupart des cas, ils ne vous empêcheront pas de poursuivre votre traitement mais votre médecin peut décider de diminuer la dose de **ribavirine**. Il se peut aussi que votre médecin choisisse de cesser le traitement par **ribavirine**. Dans ce cas, le traitement pourra être repris plus tard si nécessaire, quand votre médecin le jugera possible, mais à une dose moins élevée.

En fonction des autres médicaments que vous prenez avec la **ribavirine**, les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants :

- Fatigue
- Anémie (diminution de l'hémoglobine)
- Insomnie
- Maux de tête
- Nausées





Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommoder ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

### ● Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la ribavirine ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie. De plus l'alcool pourrait diminuer l'efficacité du traitement.

### Grossesse/contraception

La ribavirine est contre-indiquée chez la femme enceinte ainsi que chez les hommes dont la partenaire est enceinte, car il existe des risques importants de malformations congénitales et de mort du fœtus. Vous devrez faire un test de grossesse avant de commencer le traitement par ribavirine.

Assurez-vous que vous et votre partenaire utilisez chacun un moyen de contraception efficace pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 6 mois après la fin du traitement par ribavirine.

Avisez votre médecin si vous souhaitez commencer un traitement contre le VHC et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

### ● Allaitement

Il est probable que la ribavirine passe dans le lait maternel. Par prudence, il vous est recommandé de ne pas allaiter tant que vous êtes traitée par ribavirine ainsi que dans les mois qui suivent la fin du traitement. Si vous allaitez encore votre enfant lorsque vous débutez le traitement par ribavirine, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Mode de conservation

Conservez les comprimés d'IBAVYR<sup>MC</sup> ou de MODERIBA<sup>MC</sup> dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86 °F); évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

### ● Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.


Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_


Téléphone : \_\_\_\_\_

### ● J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



Plus de 18 h



Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.