



## Sofosbuvir (Solvadi<sup>MC</sup>) Comprimé à 400 mg



### Comment ce médicament agit-il ?

Le Solvadi<sup>MC</sup> est un agent antiviral inhibiteur de la polymérase NS5B utilisé pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

En association avec d'autres médicaments, le Solvadi<sup>MC</sup> empêche la réplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

### ● Comment prendre ce médicament ?

Solvadi<sup>MC</sup> ➔ 1 comprimé à 400 mg.  
Prenez 1 comprimé 1 fois par jour.

Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.

Le Solvadi<sup>MC</sup> est toujours associé à d'autres médicaments agissant contre le VHC et ne doit pas être utilisé seul.

Il est important de prendre le Solvadi<sup>MC</sup> de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

### Est-ce que je peux prendre le Solvadi<sup>MC</sup> avec mes autres médicaments ?

Peu d'interactions médicamenteuses sont attendues avec le Solvadi<sup>MC</sup>.

Cependant, les médicaments suivants ne doivent pas être associés avec le Solvadi<sup>MC</sup>. Ne prenez pas Solvadi<sup>MC</sup> et informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un ou plusieurs de ces médicaments :

- Anti-convulsivants : carbamazépine (Tegretol<sup>MC</sup>), oxcarbazépine (Trileptal<sup>MC</sup>), phénytoïne (Dilantin<sup>MC</sup>), phénobarbital (Phenobarb<sup>MC</sup>)
- Médicaments anti-tuberculeux : rifabutine (Mycobutin<sup>MC</sup>), rifampicine (Rofact<sup>MC</sup>)

Attention car le Solvadi<sup>MC</sup> n'est jamais prescrit seul et est toujours associé à d'autres médicaments. Reportez-vous aux informations qui vous ont été données concernant les interactions médicamenteuses de vos autres traitements.

Par précaution, il est toujours préférable de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

### ● Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les effets indésirables principaux observés du Solvadi<sup>MC</sup> lorsqu'il est associé à la ribavirine (Ibavyr<sup>MC</sup> ou Moderiba<sup>MC</sup>) sont d'intensité légère et ne nécessitent pas d'arrêt du traitement. Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées
- Difficulté à dormir
- Démangeaisons
- Anémie (diminution des globules rouges)

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre si vous avez des vomissements :

**Moins de 2 heures après la prise de Solvadi<sup>MC</sup>**, il faut reprendre une autre dose.

**Plus de 2 heures après la prise de Solvadi<sup>MC</sup>**, il faut prendre la dose suivante au moment prévu initialement.

Cependant, les médicaments utilisés en combinaison avec le Solvadi<sup>MC</sup> peuvent causer d'autres effets indésirables. Référez-vous aux médicaments avec lesquels il est combiné pour connaître les effets indésirables possibles.

Aviser votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.



## ● Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le Solvadi<sup>MC</sup> ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie. De plus l'alcool pourrait diminuer l'efficacité du traitement.

## Grossesse/contraception

On ne connaît pas encore les effets du Solvadi<sup>MC</sup> chez la femme enceinte. Il faut donc vous référer aux médicaments avec lesquels il est combiné.

### Par exemple :

La ribavirine a été associée à des anomalies congénitales et/ou la mort du fœtus. Ainsi, lorsque combinée avec le Solvadi<sup>MC</sup> +/- peg-interferon, il convient de prendre minimum 2 moyens de contraception efficaces pour éviter une grossesse chez les patientes ou les conjointes des patients jusqu'à 6 mois après la fin du traitement.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez débiter un traitement contre le virus de l'hépatite C et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

## Allaitement

La présence du sofosbuvir et de ses métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement avec Solvadi<sup>MC</sup>.

## ● Mode de conservation

Conservez les comprimés de Solvadi<sup>MC</sup> dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30 °C ou 59 à 86 °F); évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez ce médicament dans son contenant original.

Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

## ● Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.


Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_


Téléphone : \_\_\_\_\_

## ● J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



Plus de 12 h



Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.