



Elbasvir/Grazoprévir (Zepatier^{MC}) Comprimé 50/100 mg



Comment ce médicament agit-il ?

Zepatier^{MC} est une combinaison de deux médicaments, soient elbasvir et grazoprévir, indiqué pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

Zepatier^{MC} bloque plusieurs étapes du processus de réplication du virus. Ceci empêche la multiplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

Comment prendre ce médicament ?

Zepatier^{MC}  1 comprimé à 50/100 mg.

Prenez 1 comprimé 1 fois par jour.

Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.

Zepatier^{MC} peut vous être prescrit seul ou associé à d'autres médicaments contre les VHC, comme le sofosbuvir (Sovaldi^{MC}) et/ou la ribavirine (Ibavyr^{MC}).

Il est important de prendre Zepatier^{MC} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

La durée de traitement peut varier de 8, 12 à 16 semaines dépendant :

- Du type de virus
- De votre condition hépatique
- De la réponse à un traitement antérieur
- De votre condition rénale

Est-ce que je peux prendre le Zepatier^{MC} avec mes autres médicaments ?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Informez particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez ce qui suit :

- Médicaments pour prévenir les rejets de greffe : cyclosporine (Neoral^{MC}), tacrolimus (Advagraf^{MC}, Prograf^{MC})

- Médicaments contre les infections causées par des champignons, comme kétoconazole
- Médicaments pour prévenir les crises convulsives, comme carbamazépine (Tégrétol^{MC}), oxcarbazépine (Trileptal^{MC}), phénytoïne (Dilantin^{MC})
- Médicaments contre l'hypertension artérielle pulmonaire, comme le bosentan (Tracleer^{MC})
- Médicament pour le traitement des infections telles que la tuberculose, comme rifampine (Rifater^{MC}, Rifadin^{MC}, Rofact^{MC}), rifabutine (Mycobutin^{MC})
- Médicament pour abaisser le taux de cholestérol, comme rosuvastatine (Crestor^{MC}), atorvastatine (Lipitor^{MC}), simvastatine (Zocor^{MC}), lovastatine (Mevacor^{MC}), fluvastatine (Lescol^{MC})
- Médicaments contre l'infection par le VIH, comme atazanavir (Reyataz^{MC}), tipranavir (Agénérase^{MC}), ritonavir (Norvir^{MC}), darunavir (Prezista^{MC}, Prezcobix^{MC}), lopinavir-r (Kaletra^{MC}), saquinavir (Invirase^{MC}), éfavirenz (Sustiva^{MC}), étravirine (Intelence^{MC}), Stribild^{MC}
- Produit naturel : Millepertuis (St John's wort)


Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les effets indésirables principaux observés de ZEPATIER^{MC} sont d'intensité légère et ne nécessite pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées

Aviser votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.





À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

● Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le Zepatier^{MC} ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie. De plus l'alcool pourrait diminuer l'efficacité du traitement.

Grossesse

On ne connaît pas encore les effets de l'elbasvir et du grazoprévir chez la femme enceinte. Il faut donc vous référer aux médicaments avec lesquels il est combiné.

Par exemple,

- La ribavirine a été associée à des anomalies congénitales et/ou la mort du fœtus. Ainsi, lorsque combinée avec Zepatier^{MC}, il convient de prendre minimum 2 moyens de contraception efficaces pour éviter une grossesse chez les patientes ou les conjointes des patients jusqu'à 6 mois après la fin du traitement.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez débiter un traitement contre le virus de l'hépatite C et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Allaitement

La présence de l'elbasvir, du grazoprévir et de leurs métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement par Zepatier^{MC}.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Zepatier^{MC} dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30 °C ou 59 à 86 °F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

● Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.


Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____


Téléphone : _____

● J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



Plus de 16 h



Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.