


TÉNOFOVIR/ EMTRICITABINE/ÉFAVIRENZ (Atripla^{MC})

Comment ce médicament agit-il ?

L'atrima^{MC} est une combinaison de trois antirétroviraux (anti-VIH). Il agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

L'atrima^{MC} est utilisé afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder votre système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

L'atrima^{MC} ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser un condom en latex, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Le jour de la dose oubliée :

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Le lendemain de la dose oubliée :

Laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.



Mélange de médicaments !

L'Atripla^{MC} peut interagir avec d'autres médicaments. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre plus particulièrement des médicaments pour soulager la douleur tels que des anti-inflammatoires (Aspirine, Advil, Motrin, etc.), un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec l'Atripla^{MC} ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement

L'Atripla^{MC} est contre-indiqué chez la femme enceinte. Avisez rapidement votre médecin si vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Comment prendre ce médicament ?

ATRIPLA^{MC}

1 comprimé
300 mg de ténofovir, 200 mg d'emtricitabine
et 600 mg d'éfavirenz

1 fois par jour au coucher

L'atrima^{MC} doit être pris à jeun.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une résistance. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

Si vous êtes porteur de l'hépatite B (VHB) et cessez l'Atripla^{MC} cela peut aggraver l'hépatite. N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



Quels sont les effets indésirables ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités Continuez le médicament	<ul style="list-style-type: none">- Fatigue, maux de tête, troubles du sommeil- Perte d'appétit, nausée, diarrhée légère, gaz intestinaux- Se sentir endormi, étourdissements, troubles de concentration, rêves bizarres, "gueule" de bois le matin
Consultez votre médecin. Continuez le médicament	<ul style="list-style-type: none">- Rash (rougeur sur la peau) seul- Douleur au niveau des os- Hyperpigmentation de la paume des mains et de la plante des pieds- Décoloration de la peau (petites taches ou taches de rousseur)
Consultez votre médecin immédiatement .	
<ul style="list-style-type: none">- Rash AVEC : - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - enflure, cloques (bulles sur la peau) - rougeur des yeux - nausées, vomissements, diarrhée- douleur aux muscles et articulations	

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Suivi médical

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera le fonctionnement de vos reins. L'Atripla^{MC} peut occasionner une toxicité rénale chez certaines personnes.

Où et comment garder l'Atripla^{MC} ?

Éviter les endroits humides tels que la salle de bain.

Conservez l'Atripla^{MC} dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

