

FOSAMPRÉNAVIR/RITONAVIR (Telzir^{MD})/(Norvir^{MD})

GXLL7



Comment ce médicament agit-il ?

Le fosamprénavir et le ritonavir sont des antirétroviraux (anti-VIH). Ils agissent en empêchant la multiplication du VIH (virus de l'immunodéficience humaine).

Le fosamprénavir et le ritonavir sont utilisés avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Ils aident à garder votre système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le fosamprénavir et le ritonavir ne guérissent pas le sida et n'éliminent pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.



Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.

Mélange de médicaments !

Le fosamprénavir et le ritonavir peuvent interagir avec plusieurs médicaments. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament prescrit ou non par un médecin, produit naturel ou drogue à usage récréatif.



Suivi médical

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet du fosamprénavir/ritonavir sur votre foie et sur les gras (cholesterol, triglycérides) et le sucre (glycémie).

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le fosamprénavir et le ritonavir ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du fosamprénavir et du ritonavir chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le fosamprénavir avec le ritonavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Comment prendre ces médicaments ?

FOSAMPRÉNAVIR

___ comprimé(s) à 700 mg ___ fois par jour

RITONAVIR

___ comprimé(s) à 100 mg ___ fois par jour




- Avaler en entier **avec ou sans nourriture**. Ne pas croquer ou écraser.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une résistance. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

À moins d'effets indésirables graves *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*



Quels sont les effets indésirables ?

	Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités Continuez le médicament	- Maux de tête - Fatigue - Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, diminution de l'appétit
	Contactez votre médecin Continuez le médicament	- Rash (rougeurs sur la peau) seul
	Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.	Rash AVEC : - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - Enflure, cloques (bulles sur la peau) - Rougeur des yeux - Nausées, vomissements, diarrhée - Douleurs aux muscles et articulations

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommodent. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder le fosamprénavir et le ritonavir ?

Éviter les endroits humides tels que la salle de bain.

Conservez le fosamprénavir et le ritonavir dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

Si vous êtes allergiques aux sulfamidés; mentionnez-le à votre médecin avant de débiter le fosamprénavir.

