



### Comment ce médicament agit-il ?

Le Kivexa<sup>MC</sup> est l'association de deux antirétroviraux (anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH de l'immuno-déficience humaine (VIH).

Le Kivexa<sup>MC</sup> est utilisé avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder votre système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le Kivexa<sup>MC</sup> ne guérit pas le SIDA et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser des condoms en latex, ne pas partager les seringues).



### Comment prendre ce médicament ?

#### KIVEXA<sup>MC</sup>

un (1) comprimé  
(600 mg d'abacavir et 300 mg de lamivudine)

une (1) fois par jour

Le Kivexa<sup>MC</sup> peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.



À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*

### J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

**Ne doublez pas la dose.**



Si vous êtes porteur de l'hépatite B et cessez le Kivexa<sup>MC</sup>, cela peut aggraver l'hépatite. La lamivudine qui est dans le Kivexa traite l'hépatite B.

### Mélange de médicaments !

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.



### Quels sont les effets indésirables ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités <b>Continuez le médicament</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatigue</li> <li>- Difficulté à s'endormir</li> <li>- Troubles de digestion</li> </ul>
Voyez <b>IMMÉDIATEMENT</b> votre médecin.  Le médecin peut devoir arrêter <b>définitivement le Kivexa<sup>MC</sup></b> .	<p><b>Rash</b> (rougeur sur la peau) seul ou symptômes dans au moins 2 des groupes suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fièvre</li> <li>2) nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales</li> <li>3) grande fatigue, malaise général</li> <li>4) mal de gorge, essoufflement, toux</li> </ol> <p><b>Acidose lactique</b> : nausées - vomissements - douleurs à l'estomac - perte de poids - grande fatigue et difficulté à respirer, rythme cardiaque irrégulier et sensation de froid (bras et jambes).</p>

**Si vous arrêtez par vous-même le Kivexa<sup>MC</sup>, consultez votre médecin avant de le reprendre. Le médecin s'assurera qu'il ne s'agissait pas de symptômes évoquant une réaction d'hypersensibilité.** À l'arrêt du Kivexa<sup>MC</sup>, ne jamais le reprendre par la suite, ni aucun autre médicament contenant l'abacavir tel que Ziagen<sup>MC</sup> et Trizivir<sup>MC</sup>.

### Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le Kivexa<sup>MC</sup> ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



### Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du Kivexa<sup>MC</sup> chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le Kivexa<sup>MC</sup> et que vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



### Où et comment garder le Kivexa<sup>MC</sup> ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez le Kivexa<sup>MC</sup> dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



### Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

Si vous croyez faire une réaction d'hypersensibilité au Kivexa<sup>MC</sup>, consultez rapidement votre médecin.

