



Comment ce médicament agit-il ?

Le tipranavir et le ritonavir sont des antirétroviraux (médicaments anti-VIH). Ils agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Le tipranavir et le ritonavir sont utilisés avec d'autres médicaments anti-VIH afin de ralentir la progression de la maladie. Ils aident à garder un système de défense efficace et ils diminuent le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le tipranavir et le ritonavir ne guérissent pas le SIDA et n'éliminent pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser un condom en latex, ne pas partager les seringues, etc.).



Comment prendre ce médicament ?

TIPRANAVIR	RITONAVIR
2 capsules à 250 mg	2 comprimés à 100 mg
2 fois par jour	

- Le tipranavir et le ritonavir doivent être pris en même temps avec de la **nourriture**.

Il est important de bien prendre vos médicaments sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra alors son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.



À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*

J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 5 heures après l'heure prévue :
Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



Si plus de 5 heures après l'heure prévue :
Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu. **Ne doublez pas la dose.**

Mélange de médicaments !


Le tipranavir et le ritonavir peuvent interagir avec plusieurs autres médicaments.

Par exemple, les antiacides tels que : Maalox^{MD}, Diovol^{MD} doivent être pris 2 heures avant ou après le tipranavir.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le tipranavir et le ritonavir ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.





Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement


On ne connaît pas encore les effets du tipranavir et le ritonavir chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le tipranavir et le ritonavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Quels sont les effets indésirables ?

	Effets normaux qui disparaîtront avec le temps ou qui peuvent être traités Continuez le médicament	- Diarrhée - Nausées, flatulences (gaz), vomissements, douleurs abdominales - Diminution de l'appétit - Picotements autour de la bouche
	Contactez votre médecin Continuez le médicament	- <u>Rash</u> seul (rougeurs sur la peau)

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin. 	Rash AVEC : - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - Enflure, cloques (bulles sur la peau) - Rougeur des yeux - Nausées, vomissements, diarrhée - Douleur aux muscles et aux articulations - Grande fatigue, malaises généraux
Effets hépatiques (inflammation du foie)	- Selles pâles ou grasses, douleurs abdominales ou à l'estomac, perte d'appétit/nausées - Fatigue/faiblesse - Urine foncée, jaunissement de la peau et du blanc des yeux - Démangeaisons intenses

Si vous êtes porteur de l'hépatite B ou C, vous courez un risque plus élevé de problèmes hépatiques.

Où et comment garder le tipranavir et le ritonavir ?


Le tipranavir doit être conservé au réfrigérateur (2 à 8°C ou 36 à 46°F.) Ils peuvent également être conservés dans un endroit sec et à la température de la pièce, pas plus de 60 jours. Les comprimés de ritonavir peuvent être conservés à la température de la pièce.



Garder hors de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec votre médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.



Si vous êtes allergiques aux sulfamides, mentionnez-le à votre médecin avant de débiter le tipranavir.

Suivi médical

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de ces médicaments sur votre foie, sur les gras (cholestérol, triglycérides) et le sucre (glycémie).