

Comment ce médicament agit-il ?

Le Trizivir^{MC} est une combinaison de trois antirétroviraux (médicaments anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Le Trizivir^{MC} est utilisé seul ou avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder votre système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le Trizivir^{MC} ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.

Mélange de médicaments !

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le Trizivir^{MC} ?

L'alcool pourrait augmenter les effets de l'abacavir. Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du Trizivir^{MC} chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le Trizivir^{MC} et que vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Comment prendre ce médicament ?

TRIZIVIR^{MC}

1 comprimé

2 fois par jour

Le Trizivir^{MC} peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

Si vous êtes porteur de l'hépatite B et cessez le Trizivir^{MC}, cela peut aggraver l'hépatite.

À moins d'effets indésirables graves, *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*



Quels sont les effets indésirables ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités Continuez le médicament	- Nausées, maux de tête, douleurs musculaires, insomnies et fatigue
Contactez immédiatement votre médecin	- Anémie : fatigue, essoufflement, palpitations (cœur qui bat vite), pâleur de la peau
Arrêtez et voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin. Le médecin peut devoir arrêter définitivement le Trizivir . Ne jamais le reprendre par la suite, ni aucun médicament contenant l'abacavir.	- Acidose lactique : nausées, vomissements, douleurs à l'estomac, perte de poids, grande fatigue et difficulté à respirer - Rash (rougeur sur la peau) seul ou symptômes dans au moins 2 de groupes suivant : 1) fièvre 2) nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales 3) grande fatigue, malaise général 4) mal de gorge, essoufflement, toux

N.B: Si vous arrêter par vous-même le Trizivir^{MC} en raison d'effets indésirables ou d'une maladie, consultez votre médecin avant de le reprendre. Le médecin s'assurera qu'il ne s'agissait pas de symptômes évoquant une réaction d'hypersensibilité.

Où et comment garder le Trizivir^{MC} ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez le Trizivir^{MC} dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

Si vous avez le doute de faire une réaction d'hypersensibilité à l'abacavir, consultez votre médecin.

