



Comment ce médicament agit-il ?

L'atazanavir est un médicament antirétroviral (anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immuno-déficience humaine).

L'atazanavir est utilisé avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder votre système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

L'atazanavir ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues) pour éviter de transmettre le VIH.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu. Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.



Mélange de médicaments !

L'atazanavir peut interagir avec certains médicaments. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

Particulièrement les médicaments qui affectent l'acidité de l'estomac tel que : Maalox^{MD}, Diovol^{MD}, Pepsid AC^{MD}, Zantac^{MD}, etc. Ces médicaments peuvent diminuer l'efficacité de l'atazanavir. Ne prenez pas de millepertuis (St. John's wort) avec l'atazanavir. Si vous prenez du Viagra^{MD}, Cialis^{MD} ou Levitra^{MD}, la dose de ces médicaments devra être diminuée. Éviter la consommation de jus de pamplemousse avec l'atazanavir.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec l'atazanavir ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur d'une hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.



Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de l'atazanavir chez la femme enceinte. Discutez en avec votre médecin si vous voulez prendre l'atazanavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Comment prendre ce médicament ?

Atazanavir
2 capsules à 200 mg
1 fois par jour

L'atazanavir doit être pris **avec de la nourriture**, à la même heure chaque jour, environ aux 24 heures.

Ne pas ouvrir les capsules, elles doivent être avalées en entier.



Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose, sinon, le virus peut développer une résistance. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace. À moins d'effets indésirables graves (voir section effets indésirables), n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.

Quels sont les effets indésirables ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités Continuez le médicament	<ul style="list-style-type: none"> - Douleur au ventre - Nausées, diarrhée - Maux de tête
Contactez votre médecin Continuez le médicament	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Ictère</u> : jaunissement de la peau ou du blanc de l'oeil - <u>Rash</u> (rougeurs sur la peau) seul
Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.	<p>Rash AVEC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - Enflure, cloques (bulles sur la peau) - Rougeur des yeux - Nausées, vomissements, diarrhée - Douleurs aux muscles et articulations <p>Effet sur le rythme cardiaque :</p> <ul style="list-style-type: none"> - étourdissements, palpitations ou battements cardiaques irréguliers <p>Pierres aux reins : douleur dans le dos ou sur le côté, sang dans l'urine, douleurs lorsqu'on urine</p>

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommoder. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder l'atazanavir ?

Éviter les endroits humides tels que la salle de bain. Conservez l'atazanavir dans un endroit sec et à la température de la pièce.



Gardez hors de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

