


Comment ce médicament agit-il ?

Le Combivir^{MD} est une combinaison de deux antirétroviraux (médicaments anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Le Combivir^{MD} est utilisé avec d'autres médicaments anti-VIH afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder un système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le Combivir^{MD} ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu. **Ne doublez pas la dose.**



Mélange de médicaments !

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le Combivir ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



Grossesse et allaitement

Le Combivir^{MD} peut être utilisé durant la grossesse.

L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Comment prendre ce médicament ?

COMBIVIR^{MD}

1 comprimé
150 mg de lamivudine et 300 mg de zidovudine

2 fois par jour

Le combivir^{MD} peut être pris **avec ou sans nourriture.**






Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une résistance. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

À moins d'effets indésirables graves, *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*

Si vous êtes porteur de l'hépatite B et cessez le combivir^{MD}, cela peut aggraver l'hépatite. N'arrêtez pas le combivir^{MD} sans en parler avec votre médecin.

Quels sont les effets indésirables ?

	Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité Continuez le médicament	- Nausées, maux de tête, insomnie, fatigue, douleurs musculaires - Vomissements, douleurs abdominales
	Contactez votre médecin Continuez le médicament	- <u>Anémie</u> : fatigue, essoufflement, palpitations (cœur qui bat vite), pâleur de la peau
	Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.	- <u>Acidose lactique</u> : nausées, vomissements, douleurs à l'estomac, perte de poids, grande fatigue et difficulté à respirer - <u>Pancréatite</u> : douleurs abdominales, nausées, vomissements

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Suivi médical

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de ces médicaments sur votre foie, sur les gras (cholestérol, triglycérides) et sur le sucre (glycémie).

Où et comment garder le Combivir ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez le Combivir^{MD} dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

