




Comment ce médicament agit-il ?

L'enfuvirtide est un médicament antirétroviral (anti-VIH). Il agit en empêchant le VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine) d'entrer dans nos cellules du système immunitaire (lymphocytes T CD4+).

L'enfuvirtide est utilisé avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder votre système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

L'enfuvirtide ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



Comment prendre ce médicament ?

6 à 16 ans : 2 mg/kg (maximum 90 mg)
Plus grand que 16 ans : 90 mg (1 mL)

Injectez sous la peau ____ mg (____ mL) deux fois par jour

L'injection peut-être faite sur les côtés ou l'arrière des bras, sur la partie externe des cuisses ou sur l'abdomen. *L'injection doit être donnée à un point d'injection différent du précédent et exempt de réaction visible. L'injection ne doit pas être donnée aux endroits où un frottement risque de provoquer une irritation, comme la taille ou la partie interne des cuisses. Évitez aussi les 2-3 cm autour du nombril.* Pour les directives complètes, lisez le "Guide de l'administration de Fuzeon" qui est fourni par la compagnie avec le médicament. Il est important que vous jetiez vos seringues usagées dans le contenant fourni par la compagnie.

À moins d'effets indésirables graves (voir section effets indésirables), n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.

J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu. Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.



Ne doublez pas la dose.




Mélange de médicaments !

Pour l'instant, l'enfuvirtide ne semble pas interagir avec d'autres médicaments.



Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables ?

	Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité Continuez le médicament	Réactions légères aux sites d'injection : démangeaison, enflure, rougeur, douleur ou sensibilité, durcissement de la peau ou bosse.
	Contactez votre médecin Continuez le médicament	Réaction sévère aux sites d'injection : écoulement, une sensation de chaleur, une enflure, une rougeur ou une douleur intense au point d'injection qui limite vos activités ou nécessite des médicaments contre la douleur. Si les réactions au point d'injection ne disparaissent pas dans les 7 à 10 jours. Si vous avez une toux et de la fièvre.
	Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.	Réaction allergique : difficulté à respirer, fièvre accompagnée de vomissements et d'une éruption cutanée, sang dans l'urine ou enflure des pieds.

Aviser votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec l'enfuvirtide ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur d'une hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.



Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou des drogues.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de l'enfuvirtide chez la femme enceinte. Discutez en avec votre médecin si vous voulez prendre l'enfuvirtide et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Où et comment garder l'enfuvirtide ?

Pas dans la salle de bain. Conservez l'enfuvirtide dans un endroit sec et à la température de la pièce.



La fiole avec la poudre mélangée avec de l'eau stérile pour injection peut être conservée au réfrigérateur un maximum de 24 heures.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

