

Comment ce médicament agit-il ?

L'étravirine est un médicament antirétroviral (anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

L'étravirine est utilisé avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder un système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

L'étravirine ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).

**J'ai oublié de prendre une dose !**

Si moins de 6 heures après l'heure prévue : Prenez la dose oubliée dès que possible **avec de la nourriture** et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévue.



Si plus de 6 heures après l'heure prévue : Laisser tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose **avec de la nourriture** selon l'horaire prévue.

Ne doublez pas la dose.

**Mélange de médicaments !**

L'étravirine peut interagir avec certains médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec l'étravirine ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

**Grossesse et allaitement**

On ne connaît pas encore les effets de l'étravirine chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre l'étravirine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

**Comment prendre ce médicament ?****ÉTRAVIRINE**

1 comprimés à 200 mg

2 fois par jour

L'étravirine doit être pris **avec de la nourriture** et avaler en entier.

Ne pas croquer ou écraser le comprimé. Toutefois, les comprimés peuvent être dissous dans l'eau. Bien mélanger, boire, rincer le verre et boire à nouveau.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

À moins d'effets indésirables graves, *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*

**Quels sont les effets indésirables ?**

Etravirine est généralement bien toléré mais les effets indésirables suivants ont été observés :

	Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité Continuez le médicament	<ul style="list-style-type: none"> - Maux de tête, fatigue, difficulté à s'endormir - Diarrhée, douleurs abdominales, nausées, brûlures d'estomac - Fourmillements ou douleurs dans les pieds ou les mains
	Contactez votre médecin Continuez le médicament	Rash (rougeurs sur la peau) seul
	Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.	Rash AVEC : <ul style="list-style-type: none"> - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - Enflure, cloques (bulles sur la peau) - Rougeur des yeux - Nausées, vomissements, diarrhée - Douleur aux muscles et articulations - Grande fatigue

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder l'étravirine ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez l'étravirine dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.

**Conseils généraux**

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

