



### Comment ce médicament agit-il ?

Le Kaletra<sup>MD</sup> est un mélange de deux antirétroviraux (médicaments anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Le Kaletra<sup>MD</sup> est utilisé avec d'autres médicaments anti-VIH afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder un système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le Kaletra<sup>MD</sup> ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom en latex, ne pas partager les seringues, etc).



### Comment prendre ce médicament ?

#### KALETRA<sup>MD</sup>

- \_\_\_ comprimé(s) 200/50 mg
- \_\_\_ comprimé(s) 100/25 mg
- \_\_\_ mL de la solution 80/20 mg/mL

\_\_\_ fois par jour

Prendre les comprimés **avec ou sans nourriture**. Les comprimés doivent être avalés en entier sans les mâcher, ni les couper ni les broyer. Prendre la solution orale avec nourriture.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.



À moins d'effets indésirables graves, *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*

### J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

**Ne doublez pas la dose.**



### Mélange de médicaments !

Le Kaletra<sup>MD</sup> peut interagir avec plusieurs autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.



### Quels sont les effets indésirables ?

	Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités <b>Continuez le médicament</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diarrhée, douleurs abdominales,</li> <li>- Fatigue</li> <li>- Maux de tête</li> <li>- Nausées, vomissements</li> </ul>
	Voyez <b>IMMÉDIATEMENT</b> votre médecin.	<b>Effets hépatiques</b> (inflammation du foie) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selles pâles ou grasses, douleurs abdominales ou à l'estomac, perte d'appétit</li> <li>- Fatigue/faiblesse</li> <li>- Urine foncée, jaunissement de la peau et du blanc des yeux</li> <li>- Démangeaisons intenses</li> </ul>

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de ces médicaments sur votre foie, sur les gras (cholestérol et triglycérides) et le sucre (glycémie).

Aviser votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

### Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le Kaletra<sup>MD</sup> ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



### Grossesse et allaitement

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le Kaletra<sup>MD</sup> et que vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



### Où et comment garder le kaletra<sup>MD</sup> ?

Les comprimés de Kaletra<sup>MD</sup> doivent être conservés dans le contenant original dans un endroit sec, à la température ambiante < 25°C (77°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

La solution orale de Kaletra<sup>MD</sup> doit être conservée au réfrigérateur. Elle peut également être conservée à la température ambiante, < 25°C (77°F), pour une durée de 42 jours.

Garder hors de la portée des enfants.

### Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

