



Comment ce médicament agit-il ?

Le maraviroc est un antirétroviral qui agit en empêchant l'entrée du virus du VIH dans les cellules du système immunitaire. Le VIH pénètre dans les lymphocytes du CD4 du système immunitaire en se liant à un récepteur CCR5 ou CXCR4. Le maraviroc agit en bloquant le récepteur CCR5 de manière à ce que le virus du VIH ne puisse pas s'en servir pour entrer dans le lymphocyte.

Le maraviroc est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux afin de retarder le progression de la maladie et réduire le risque d'apparition d'infections opportunistes (infections reliées au sida).

Le maraviroc ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 6 heures après l'heure prévue :
Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



Si plus de 6 heures après l'heure prévue :
Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu. **Ne doublez pas la dose.**



Mélange de médicaments !

Plusieurs médicaments peuvent interagir avec le maraviroc et la dose de ce dernier devrait être ajustée.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le maraviroc ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.



Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du maraviroc chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le maraviroc et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Comment prendre ce médicament ?

MARAVIROC
_____ comprimés à _____ mg
2 fois par jour
<input type="checkbox"/> autre

Les comprimés de maraviroc doivent être avalés en entier avec de l'eau. Ils peuvent être pris avec ou sans nourriture. Il ne faut pas les croquer, les mastiquer ou les écraser.



Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une résistance. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

À moins d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.

Quels sont les effets indésirables ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités Continuez le médicament	- Diarrhée, flatulences, nausées - Maux de tête
Consultez votre médecin. Continuez le médicament	- Toux - Fatigue - Symptômes ressemblant à ceux de la grippe - Rash (rougeurs sur la peau)
Consultez votre médecin immédiatement.	
Hépatite (inflammation du foie) :	
<ul style="list-style-type: none"> - Selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, perte d'appétit/nausées - Fatigue/faiblesse - Urine foncée, jaunissement de la peau et du blanc des yeux - Démangeaisons intenses 	

Le maraviroc est généralement bien toléré.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder le maraviroc ?

Éviter les endroits humides tels que la salle de bain.

Conservez le maraviroc dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et à la température de la pièce.



Garder hors de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme

