

**Comment ce médicament agit-il ?**

Le nelfinavir est un médicament antirétroviral (anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Le nelfinavir est utilisé avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder un système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le nelfinavir ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



**J'ai oublié de prendre une dose !**

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu. **Ne doublez pas la dose.**



**Mélange de médicaments !**

Le nelfinavir peut interagir avec plusieurs autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif



**Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le nelfinavir ?**

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



**Grossesse et allaitement**

On ne connaît pas encore les effets du nelfinavir chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le nelfinavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



**Comment prendre ce médicament ?**

**NELFINAVIR**

2 comprimés à 625 mg

2 fois par jour

- Prendre avec de la **nourriture**, au moins 125 calories et plus.
- **Avaler en entier.** Ne pas croquer ou écraser.




Le nelfinavir peut être dissous dans l'eau et mélangé à un produit laitier (pas avec du jus ou un aliment acide comme le jus d'orange, jus de tomate ou de la compote de pomme).

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.



À moins d'effets indésirables graves, *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*

**Quels sont les effets indésirables ?**

	Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité <b>Continuez le médicament</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diarrhée, flatulences (gaz)</li> <li>- Nausées, vomissements, diminution de l'appétit</li> </ul>
	Contactez votre médecin <b>Continuez le médicament</b>	<u>Rash</u> (rougeurs sur la peau)
	Voyez <b>IMMÉDIATEMENT</b> votre médecin.	<b>Rash AVEC :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche</li> <li>- Enflure, cloques (bulles sur la peau)</li> <li>- Rougeur des yeux</li> <li>- Nausées, vomissements, diarrhée</li> <li>- Douleur aux muscles et articulations</li> <li>- Grande fatigue, maux de tête</li> </ul>

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

**Où et comment garder le nelfinavir ?**

Pas dans la salle de bain.

Conservez le nelfinavir dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



**Conseils généraux**

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

