



Comment ces médicaments agissent-ils ?

Le darunavir et le ritonavir sont des antirétroviraux (médicaments anti-VIH). Ils agissent en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Le darunavir et le ritonavir sont utilisés avec d'autres médicaments anti-VIH afin de ralentir la progression de la maladie. Ils aident à garder un système de défense efficace et ils diminuent le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

Le darunavir et le ritonavir ne guérissent pas le SIDA et n'éliminent pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser un condom en latex, ne pas partager les seringues, etc.).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prezista 600 mg 2 fois par jour

Si moins de 6 heures après l'heure prévue : prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Si plus de 6 heures après l'heure prévue : laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Prezista 800 mg 1 fois par jour

Si moins de 12 heures après l'heure prévue : prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Si plus de 12 heures après l'heure prévue : laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez jamais la dose

Mélange de médicaments !

Le darunavir et le ritonavir peuvent interagir avec plusieurs autres médicaments. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament (prescription ou en vente libre), produit de santé naturel ou drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables ?

	Effets normaux qui disparaîtront avec le temps ou qui peuvent être traités Continuez le médicament	- Diarrhée ou constipation - Nausées, vomissements, douleurs à l'estomac - Maux de tête
	Contactez votre médecin Continuez le médicament	- <u>Rash</u> seul (rougeurs sur la peau)

Aviser votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder le darunavir et le ritonavir ?

Les comprimés de darunavir et de ritonavir doivent être conservés dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F); évitez les endroits humides tels que la salle de bain.



Gardez ces médicaments dans un contenant qui ferme bien et hors de la vue et de la portée des enfants.

Comment prendre ces médicaments ?

Darunavir	Ritonavir
1 comprimé à 600 mg	1 comprimé à 100 mg
2 fois par jour	
Ou	
Darunavir	Ritonavir
1 comprimés à 800 mg	1 comprimé à 100 mg
1 fois par jour	

Prenez le darunavir et le ritonavir **avec de la nourriture** à la même heure chaque jour, idéalement aux 12 heures.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une résistance. Le médicament perdra alors son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

N'arrêtez ou ne modifiez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le darunavir et le ritonavir ?

Évitez la consommation excessive ou régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur du virus de l'hépatite. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre santé.



Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous désirez prendre de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du darunavir et du ritonavir chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous prenez ou si vous voulez prendre le darunavir et le ritonavir et que vous êtes enceinte ou que vous désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Quels sont les effets indésirables ?

	Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.	Rash AVEC : - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - Enflure, cloques (bulles sur la peau) - Rougeur des yeux - Nausées, vomissements, diarrhée - Douleur aux muscles et aux articulations - Grande fatigue, malaises généraux
	Hépatite (inflammation du foie)	- Selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, perte d'appétit - Fatigue/faiblesse - Urine foncée, jaunissement de la peau et du blanc des yeux - Démangeaisons intenses

Si vous êtes porteur de l'hépatite B ou C, vous courez un risque plus élevé de problèmes hépatiques.

Suivi médical

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de ces médicaments sur votre foie, sur les gras (cholestérol, triglycérides) et le sucre (glycémie).



Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec votre médecin et avec l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

Si vous êtes allergiques aux sulfamides, mentionnez-le à votre médecin avant de débiter le darunavir.