



**Comment ce médicament agit-il ?**

La Rilpivirine est un médicament antirétroviral (anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

La Rilpivirine est utilisé avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder un système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

La Rilpivirine ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre es précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



**J'ai oublié de prendre une dose !**

**Si moins de 12 heures après l'heure prévue :** prenez-la dose oubliée dès que possible avec de la nourriture et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévue.

**Si plus de 12 heures après l'heure prévue :** laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose avec de la nourriture selon l'horaire prévue.

**Ne doublez pas la dose.**



**Mélange de médicaments !**

La Rilpivirine peut interagir avec certains médicaments. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

Les médicaments qui affectent l'acidité de l'estomac tels que : Maalox<sup>MD</sup>, Diovol<sup>MD</sup>, Pepcid AC<sup>MD</sup>, Zantac 75<sup>MD</sup>, etc., peuvent diminuer l'efficacité de la Rilpivirine.

Les antiacides (Maalox et Diovol) doivent être pris 2 heures avants ou 4 heures après la prise de la Rilpivirine. Les anti-H2 (Pepcid, Zantac) doivent être pris au moins 12 heures avant ou 4 heures après la prise de la Rilpivirine. L'utilisation des inhibiteurs de la pompe à proton (Ex. : oméprazole) est contre-indiquée. **Ne prenez pas de millepertuis (St. John's wort) avec la Rilpivirine.**

**Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec la Rilpivirine ?**

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



**Grossesse et allaitement**

On ne connaît pas encore les effets de la Rilpivirine chez la femme enceinte. Discutez en avec votre médecin si vous voulez prendre la Rilpivirine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

**Comment prendre ce médicament ?**

Rilpivirine	
	1 comprimé à 25 mg
	1 fois par jour

**La Rilpivirine doit être prise avec un repas calorique normal (environ 533 calories). La prise de Rilpivirine avec une boisson nutritionnelle riche en protéines (Boost, Ensure, etc.) ne remplace pas un repas et n'est pas suffisant pour favoriser l'absorption de la Rilpivirine.**

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une résistance. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

À moins d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.



**Quels sont les effets indésirables ?**

La Rilpivirine est généralement bien tolérée mais les effets indésirables suivants ont été observés :

Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité <b>Continuez le Médicament</b>	- Maux de tête, difficulté à s'endormir, rêves anormaux, fatigue
Contactez votre médecin <b>Continuez le Médicament</b>	- Rash (rougeurs sur la peau) seul - Changement de l'humeur persistante ou humeur dépressive
Voyez <b>IMMÉDIATEMENT</b> votre médecin	<b>Rash AVEC :</b> - Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche - Enflure, cloques (bulles sur la peau) - Rougeur des yeux - Nausées, vomissements, diarrhée - Douleur aux muscles et articulations - Grande fatigue, malaises généraux.  <b>Effet sur le rythme cardiaque :</b> - étourdissements, palpitations ou battements cardiaques irréguliers



Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

**Où et comment garder la Rilpivirine ?**

Pas dans la salle de bain.

Conservez la Rilpivirine dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



**Conseils généraux**

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

